

ESCLUSIONE TEMPORANEA del candidato donatore per:

5 ANNI:

- glomerulonefrite acuta (dopo la guarigione definitiva)

2 ANNI:

- tubercolosi (dopo la guarigione definitiva) - i donatori con Mantoux positiva e controllo radiologico del torace negativo sono idonei alle donazioni
- osteomielite (dopo la guarigione definitiva)
- toxoplasmosi (dopo la guarigione definitiva ed in assenza di anticorpi IgM)
- reumatismo articolare acuto (dopo la guarigione definitiva)
- brucellosi (dopo la guarigione definitiva)

1 ANNO:

- esposizione accidentale al sangue e/o a strumenti contaminati da sangue
- trasfusioni di sangue o di emocomponenti o trattamento con farmaci emoderivati
- endoscopie o uso di catetere
- trapianto di tessuti o di cellule
- intervento chirurgico di rilievo (addome aperto) o in endoscopia
- allergia ai farmaci (con particolare attenzione alla penicillina, dopo l'ultima somministrazione)

- contatto diretto con epatitici (convivenza sotto lo stesso tetto): se il donatore è già vaccinato per HBV può donare se convivente con partner HBsAg POSITIVO
- rapporti sessuali con persone infette o a rischio maggiore di infezione da HBV, HCV, HIV
- rapporti sessuali occasionali a rischio di trasmissione di malattie infettive (nuovo partner)
- vaccinazione antirabbica (se dopo l'esposizione)
- parto o interruzione di gravidanza
- agopuntura (se non praticata da medico autorizzato e con l'utilizzo di aghi a perdere): per la documentazione di tali dati è necessaria la certificazione del medico
- piercing
- tatuaggi
- assunzione di droghe leggere (fumo)

6 MESI:

- malattia DI Lyme (dopo la guarigione)
- mononucleosi (dopo guarigione)
- soggiorno in zone tropicali (dopo il ritorno ed in assenza di febbri e/o malesseri di natura indeterminata)
- estrazione dente/i del giudizio
- devitalizzazione dente/i (dall'ultimo eseguito)
- impianto perni (dall'ultimo eseguito)
- interventi chirurgici minori

3 MESI:

- somministrazione di sieri di origine animale
- intervento chirurgico in anestesia lombare
- puntura di zecca

1 MESE:

- estrazione dentaria
- detartrasi
- somministrazione di vaccini costituiti da virus o batteri viventi e attenuati quali il BCG, antivaiolo, antipolio orale, antimorbillo, antiparotite, antirosolia, anti febbre gialla, anti epatite A, anti Herpes, antivaiolo
- convivenza con pazienti affetti da malattie esantematiche, parotite, mononucleosi

1 SETTIMANA:

- otturazione semplice senza devitalizzazione

48 ORE:

- somministrazione di vaccini costituiti da virus, batteri, rickettsie uccisi o inattivati dai tossoidi, quali contro epatite B, rabbia (profilassi), tetano, difterite, pertosse, febbre delle Montagne rocciose, influenza, poliomielite (iniezione), peste, tifo, paratifo e colera se asintomatici